

Эспераль

Страна-производитель Бельгия , Лаборатория Миллот Франция , Лаборатория Соляк Франция , Санофи Винтроп Индустрия Франция , Санофи Винтроп Индустрия Португалия , Софаримекс Индустрия Кимика и Фармацевтика Лда Португалия , Торрент Фармасьютикалс Индия

Фарм-Группа Средства для лечения алкоголизма

Производители Кела Лаборатория(Бельгия), Лаборатория Миллот(Франция), Лаборатория Соляк(Франция), Санофи Винтроп Индустрия(Франция), Санофи Винтроп Индустрия(Португалия), Софаримекс Индустрия Кимика и Фармацевтика Лда(Португалия), Торрент Фармасьютикалс(Индия)

Международное название Дисульфирам

Синонимы Дисульфирам, Радотер, Тетурам, Тетурам (Антабус), Эспераль
Дисульфирам

Лекарственные формы таблетки для имплантаций 100мг, таблетки 500мг, таблетки для имплантаций

Состав Активное вещество - дисульфирам.

Показания к применению Хронический алкоголизм (профилактика рецидивов, отсутствие терапевтического эффекта от др. методов), хроническая никелевая интоксикация.

Противопоказания Гиперчувствительность, тиреотоксикоз, сахарный диабет, резко выраженный кардиосклероз, атеросклероз мозговых сосудов, пред- и постинфарктные состояния, аневризма аорты, коронарная недостаточность, гипертоническая болезнь II-III стадий, сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, туберкулез легких с кровохарканьем, бронхиальная астма, выраженная эмфизема легких, эрозия желудка, болезни печени и почек, психические заболевания, эпилептиформный синдром, полиневрит, глаукома, беременность. Ограничение к применению: возраст старше 60 лет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), эндартериит, ранее перенесенные психозы на фоне приема дисульфирама.

Побочное действие Металлический привкус во рту, гепатит, нервно-психические расстройства, головная боль, полиневриты нижних конечностей, кожный зуд, крапивница.

Взаимодействие Эффекты, в т.ч. нейротоксические, усиливают трициклические антидепрессанты (амитриптилин), метронидазол, изониазид, снижает (реакцию на алкоголь) - аскорбиновая кислота. Уменьшает свертываемость крови на фоне непрямых антикоагулянтов. Повышает токсичность дифенина.

Передозировка Проявляется коматозным состоянием, коллапсом, различными неврологическими явлениями. Лечение симптоматическое.

Особые указания Нет сведений.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 год.