

## Эстрацит

Страна-производитель Швеция , Фармация Италия , Фармация и Апджон Италия  
Фарм-Группа Эстрогенные средства

Производители Фармация(Швеция), Фармация(Италия), Фармация и Апджон(Италия)

Международное название Эстрамустин

Лекарственные формы капсулы 140мг, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 300мг, капсулы 150мг, 300мг

Состав Действующее вещество - эстрамустин.

Показания к применению Рак предстательной железы.

Противопоказания Гиперчувствительность, цереброваскулярная недостаточность, сердечная недостаточность, ИБС, бронхиальная астма, нарушения функций печени и почек, желчнокаменная болезнь, холестатический гепатит, хронические вирусные заболевания, пептические язвы желудка, остеопороз, сахарный диабет, гипоплазия костного мозга, тромбозы, склонность к тромбозам.

Побочное действие Диспептические явления: тошнота, рвота, диарея; нарушение сна, отеки, увеличение в объеме и набухание грудных желез, склонность к тромбообразованию, снижение либидо, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, аллергические реакции.

Взаимодействие Кальций и кальцийсодержащие средства ослабляют активность; минералокортикоиды и глюкокортикоиды повышают токсичность. Усиливает побочные эффекты гепатотоксических средств и никотина.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания Нет сведений.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 год.