

Эстулик

Страна-производитель Швейцария , Эгис фармацевтический завод Венгрия
Фарм-Группа Антигипертензивные средства, влияющие на сосудодвигательные центры мозга

Производители Сандоз Фарма Лтд(Швейцария), Эгис фармацевтический завод(Венгрия)

Международное название Гуанфацин

Лекарственные формы таблетки 1мг

Состав Активное вещество - гуанфацин.

Показания к применению Гипертонический криз, гипертоническая болезнь, первичная открытоугольная глаукома.

Противопоказания Кардиогенный шок, гипертензия различного происхождения, беременность, кормление грудью. Ограничения к применению: Нарушение проводимости, внутрисердечные блокады, выраженная депрессия, заболевания сосудов головного мозга.

Побочное действие Сухость во рту, запор, седация, сонливость, чувство усталости, слабость, возможно увеличение артериального давления (при первом приеме).

Взаимодействие Гипотензивный эффект ослабляют антидепрессанты, альфа-2-адренорецепторы, симпатомиметики. Антигипертензивное действие усиливают диуретики, бета-адреноблокаторы, периферические вазодилататоры. При одновременном применении с бета-адреноблокаторами возможно чрезмерное снижение частоты сердечных сокращений. Ослабляет эффективность периферических альфа-адреноблокаторов, симпатомиметиков, усиливает кардиодепрессивную активность бета-адреноблокаторов, седативную-нейролептиков.

Передозировка Симптомы: нарушение сознания, коллапс. Лечение: симптоматическое.

Особые указания Не рекомендуется для лечения пациентов с AV-блокадой II и III степени. С осторожностью и под постоянным контролем врача следует применять гуанфацин у пациентов с цереброваскулярной или коронарной недостаточностью. После внезапного прекращения терапии возможно развитие синдрома отмены. Во время лечения следует постоянно контролировать АД. Следует избегать употребления алкоголя. Не рекомендуется во время лечения гуанфацином вождение автотранспорта и работа на потенциально опасном оборудовании.

Литература Энциклопедия лекарств 2003г. Справочник "Видаль 2006".