

Этазол-натрий

Страна-производитель Россия

Фарм-Группа Противомикробные сульфаниламидные средства

Производители Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко(Россия)

Международное название Сульфаэтидол

Синонимы Этазол, Этазол растворимый

Лекарственные формы раствор для инъекций 10%, раствор 10%

Состав Активное вещество - сульфаэтидол.

Показания к применению Инфекции мочевыводящих путей (пиелит, цистит), рожа, ангина, пневмония, дизентерия, перитонит, раневая инфекция.

Противопоказания Гиперчувствительность, печечно-почечная недостаточность, болезни крови, порфирия, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, мочекаменная болезнь, беременность, кормление грудью (на время лечения следует прекратить грудное вскармливание).

Побочное действие Головная боль, головокружение, диспептические явления: тошнота, рвота, боли в животе, диарея; интерстициальный нефрит, лекарственный гепатит, кристаллурия, метгемоглобинемия, агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, аллергические реакции: синдром Лайелла, синдром Стивенса - Джонсона, анафилактический шок.

Взаимодействие Усиливает эффект антикоагулянтов, противосудорожных и пероральных гипогликемических средств, а также побочные действия цитостатиков, иммунодепрессантов, гепато- и нефротоксичных средств.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания Нет сведений.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 год.