

Этамбутол

Страна-производитель Россия , Вейв Интернейшнл Индия , Ипка Лабораториз Лтд Индия , Краковский фармацевтический завод Польфа Польша , Лайф Фарма Италия , Люпин Лабораторис Индия , Макиз-Фарма Россия , Плива Краков Польша , Польфа Польша , Санавита Гезундхайтсмиттель ГмбХ и Ко

Фарм-Группа Противотуберкулезные средства разных химических групп

Производители Акрихин ХФК(Россия), Вейв Интернейшнл(Индия), Ипка Лабораториз Лтд(Индия), Краковский фармацевтический завод Польфа(Польша), Лайф Фарма(Италия), Люпин Лабораторис(Индия), Макиз-Фарма(Россия), Плива Краков(Польша), Польфа(Польша), Санавита Гезундхайтсмитте

Международное название Этамбутол

Синонимы Апбутол, ЕМБ-Фатол 400, Комбутол, Ли-бутол, Либутол, Миамбутол, Микобутол, Темибутол, Эбутол, Энбутол, Этамбусин, Этамбутол-Акри

Лекарственные формы таблетки 100мг, таблетки 400мг, таблетки 200мг, таблетки 600мг, таблетки 800мг, капсулы 250мг

Состав Действующее вещество - Этамбутол.

Показания к применению Туберкулез.

Противопоказания Гиперчувствительность, подагра, неврит зрительного нерва, катаракта, воспалительные заболевания глаза, диабетическая ретинопатия, нарушение функции почек, беременность. Ограничения к применению. Кормление грудью (на время лечения необходимо прекратить грудное вскармливание).

Побочное действие Диспептические явления (тошнота, рвота, абдоминальные боли), головокружение, дезориентация в пространстве, галлюцинации, периферические невриты, неврит зрительного нерва, обострение (приступ) подагры, лейкопения, гиперурикемия, аллергические реакции.

Взаимодействие Усиливает эффекты противотуберкулезных средств и нейротоксичность аминогликозидов, аспарагиназы, карбамазепина, ципрофлоксацина, имипенема, солей лития, метотрексата, хинина.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Данных нет.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.