

Этамбутол-Акри

Страна-производитель Россия

Фарм-Группа Противотуберкулезные средства разных химических групп

Производители Акрихин ХФК(Россия)

Международное название Этамбутол

Синонимы Апбутол, ЕМБ-Фатол 400, Комбутол, Ли-бутол, Либутол, Миамбутол, Микобутол, Темибутол, Эбутол, Энбутол, Этамбусин, Этамбутол

Лекарственные формы таблетки 400мг

Состав Действующее вещество - Этамбутол.

Показания к применению Туберкулез.

Противопоказания Гиперчувствительность, подагра, неврит зрительного нерва, катаракта, воспалительные заболевания глаза, диабетическая ретинопатия, нарушение функции почек, беременность. Ограничения к применению. Кормление грудью (на время лечения необходимо прекратить грудное вскармливание).

Побочное действие Диспептические явления (тошнота, рвота, абдоминальные боли), головокружение, дезориентация в пространстве, галлюцинации, периферические невриты, неврит зрительного нерва, обострение (приступ) подагры, лейкопения, гиперурикемия, аллергические реакции.

Взаимодействие Усиливает эффекты противотуберкулезных средств и нейротоксичность аминогликозидов, аспарагиназы, карбамазепина, ципрофлоксацина, имипенема, солей лития, метотрексата, хинина.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Данных нет.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.