

Этамзилат-Ферейн

Страна-производитель Россия

Фарм-Группа Гемостатические средства разных групп

Производители Брынцалов-А(Россия)

Международное название Этамзилат

Синонимы Дицинон, Этамзилат

Лекарственные формы таблетки 250мг

Состав Действующее вещество - Этамзилат.

Показания к применению Паренхиматозные и капиллярные кровотечения, вторичные кровотечения на фоне тромбоцитопении и тромбоцитопатии, профилактика интра- и послеоперационных кровотечений (при операциях на сосудах и сильно васкуляризованной ткани), диабетическая микроангиопатия, носовые кровотечения при артериальной гипертензии, геморрагический синдром на фоне приема аскорбиновой кислоты и антикоагулянтов непрямого действия.

Противопоказания Гиперчувствительность, геморрагии на фоне антикоагулянтов, тромбозы, тромбоэмболии.

Побочное действие Изжога, чувство тяжести в подложечной области, гиперемия лица, парестезии в нижних конечностях, снижение САД, небольшое головокружение, головная боль.

Взаимодействие Фармацевтически несовместим (в одном шприце) с др. препаратами. Введение в дозе 10 мг/кг за 1 ч до реополиглюкина предотвращает антиагрегационное действие последнего (введение после реополиглюкина не оказывает гемостатического эффекта). Допустимо сочетание с аминокaproновой кислотой, викасолом, противосвертывающими препаратами. Уменьшает тяжесть течения геморрагического синдрома, вызванного ацетилсалициловой кислотой и антикоагулянтами непрямого действия.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Данных нет.

Литература Энциклопедия лекарств 2003 г.