

Этацизин

Страна-производитель Россия , Олайнфарм Олайнский ХФЗ Латвия

Фарм-Группа Антиаритмические мембраностабилизирующие средства группы 1С

Производители Ниопик ГНЦ(Россия), Олайнфарм Олайнский ХФЗ(Латвия)

Международное название Этацизин

Лекарственные формы таблетки покрытые оболочкой 50мг

Состав Активное вещество - этацизин.

Показания к применению Желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы и тахикардии, пароксизмы мерцания предсердий, синдром ранней реполяризации желудочков.

Противопоказания Блокада сердца II-III степени, гемифасциальная блокада, кардиогенный шок, выраженная гипотензия, тяжелая сердечная недостаточность, заболевания печени и почек. Ограничения к применению: AV блокада I степени, синдром слабости синусового узла, нарушения проводимости по волокнам Пуркинье, неполная блокада ножек пучка Гиса, инфаркт миокарда, осложненный нарушениями сердечного ритма.

Побочное действие Снижение сократимости миокарда, ухудшение коронарного кровообращения, нарушения ритма сердца, изменения ЭКГ: удлинение интервала PQ, уширение зубца P и комплекса QRS, шум в ушах, головокружение, онемение губ и кончика языка, ощущение жара, нарушение зрения, тошнота.

Взаимодействие Несовместим с др. антиаритмическими препаратами хинидинового ряда и ингибиторами MAO (повышается риск появления аритмии).

Передозировка Проявляется угнетением проводимости и сократимости миокарда, возникновением аритмий. Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия; гемодиализ неэффективен.

Особые указания Внутривенно введение препарата возможно только при условии тщательного врачебного наблюдения и ЭКГ-контроля.

Литература 1. Регистр Лекарственных средств 2003 года.2. Мешков А.П. Аритмии сердца: диагностика и лечение. Изд. НГМА, 1999г.