

Этимизол

Страна-производитель Россия , ГНИИСКЛС Россия , Фармак Украина
Фарм-Группа Психомоторные стимуляторы - производные пурина и имидазола

Производители АЙ СИ ЭН Октябрь(Россия), ГНИИСКЛС(Россия), Фармак(Украина)

Международное название Этимизол

Лекарственные формы раствор 1.5%, субстанция, таблетки 100мг

Состав Активное вещество: этимизол.

Показания к применению Стимуляция дыхания: отравления наркотиками и анальгетиками, угарным газом, хирургический наркоз (во время и после), гиповентиляция легких при ателектазе, асфиксия, постасфиксические состояния и респираторный дистресс (пренатальная профилактика) у новорожденных. В качестве противовоспалительного (артриты, полиартриты) и бронхолитического (бронхиальная астма легкого течения и обструктивный бронхит) средства, астенические состояния.

Противопоказания Тяжелое угнетение ЦНС, двигательное и психическое возбуждение, бессонница, отравление судорожными ядами, гипертензия, тяжелые формы атеросклероза, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, глаукома, пожилой возраст.

Побочное действие Диспепсия, тошнота, беспокойство, головокружение, тремор, нарушение сна.

Взаимодействие Циметидин усиливает эффекты (уменьшает инактивацию в печени).НПВС повышают анальгезирующую активность. Увеличивает T1/2 теофиллина.

Передозировка Характеризуется беспокойством, раздражительностью, головной болью, бессонницей, тахипноэ, тахикардией, тремором, усилением рефлексов, клоническими судорогами.Лечение: симптоматическое.

Особые указания Беспокойство, нарушения сна требуют уменьшения разовой дозы до 50 мг (5-6 раз в день, исключая вечерние часы). При диспептических явлениях следует принимать через 30 мин после еды. У детей (доза 1 мг/кг) возможно ослабление сокращений миокарда, снижение гемодинамического АД, повышение дАД и усиление тканевой гипоксии (у детей, родившихся в асфиксии, 1, 6, 37, 62); эту нежелательную реакцию можно ослабить назначением тиаминпирофосфата.

Литература Энциклопедия лекарств 2005 г.