

Этиол

Страна-производитель Нидерланды

Фарм-Группа Комплексообразующие соединения

Производители ЮСБ С.А.(Нидерланды)

Международное название Амифостин

Лекарственные формы порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора

Состав Действующее вещество - Амифостин.

Показания к применению Профилактика гематотоксичности ДНК-связывающих средств, нефро-, нейро- и ототоксичности препаратов платины.

Противопоказания Гиперчувствительность (в т.ч. к соединениям аминотиола, манниту), артериальная гипотензия, дегидратация, беременность, грудное вскармливание (на время лечения следует приостановить). Ограничения к применению. Выраженные нарушения функции печени и почек, детский и старческий (более 70 лет) возраст.

Побочное действие Преходящее снижение артериального давления, реже - повышение дАД, потеря сознания, покраснение лица, сопровождающееся ощущением тепла, тошнота, рвота, икота, головокружение, сонливость, чихание, снижение концентрации кальция в сыворотке крови, аллергические реакции (кожная сыпь, эозинофилия, озноб с ощущением холода и др.).

Взаимодействие Препараты, вызывающие артериальную гипотензию, в т.ч. антигипертензивные, могут усилить снижение артериального давления.

Передозировка Симптомы: выраженная артериальная гипотензия. Лечение: симптоматическое.

Особые указания Во время введения больному необходимо находиться в положении лежа на спине. Инфузию прекращают при значительном снижении артериального давления. При использовании на фоне химиопрепаратов, вызывающих рвоту, рекомендуется прием противорвотных средств и контроль за балансом жидкости во время лечения. При риске развития гипокальциемии, в т.ч. в случае нефротического синдрома, необходимо наблюдать за уровнем кальция в сыворотке крови (предпочтителен мониторинг). Сопутствующую антигипертензивную терапию отменяют за 24 ч до введения.

Литература Энциклопедия лекарств 2006г.