

Этифиллин

Страна-производитель Россия, Бик Гулден ГмбХ Германия, Дальхимфарм Россия, Ирбитский химико-фармацевтический завод Россия, Лекформ Россия, Пурин Россия, Татхимфармпрепараты Россия, Тюменский химико-фармацевтический завод Россия, Уралбиофарм Россия, Этифарм Франция

Фарм-Группа Бронхолитические средства - ингибиторы фосфодиэстеразы

Производители АЙ СИ ЭН Октябрь(Россия), Бик Гулден ГмбХ(Германия), Дальхимфарм(Россия), Ирбитский химико-фармацевтический завод(Россия), Лекформ(Россия), Пурин(Россия), Татхимфармпрепараты(Россия), Тюменский химико-фармацевтический завод(Россия), Уралбиофарм(Россия), Э

Международное название Теофиллин

Синонимы Афонилум СР, Вентакс, Диффумал 24, Дурофилин, Неотеопэк А, Ретафил, Слоу-бид, Слоу-Филлин, Спофиллин ретард 100, Спофиллин ретард 250, Тео, Теобиолонг, Теодил, Теопэк, Теостат, Теотард, Теофиллин, Теофиллин безводный, Теофиллин гранулят Н, Теофиллин-Н.С.,

Лекарственные формы таблетки 100мг, таблетки 200мг, таблетки 300мг, таблетки 150мг, таблетки покрытые оболочкой ретард мите Н 125мг, таблетки покрытые оболочкой ретард Н 250мг, раствор для внутривенных инъекций 240мг

Состав Активное вещество: Теофиллин.

Показания к применению Бронхиальная астма, астматический статус, обструктивный бронхит, эмфизема легких, апноэ у новорожденных (вспомогательное средство).

Противопоказания Гиперчувствительность, в т.ч. и к др. производным ксантина (кофеин, пентоксифиллин, теобромин), геморрагический инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, острый инфаркт миокарда, выраженный атеросклероз коронарных артерий, кровотечение в недавнем анамнезе, беременность, кормление грудью (на время лечения прекращают).

Побочное действие Беспокойство, нарушение сознания, судороги, расстройства зрения, скотома, приступы стенокардии, аритмии, тахикардия, гипотония, ларингит, першение в горле, гриппоподобный синдром, заложенность носа, ксеростомия, анорексия, тошнота, рвота, изжога, обострение холецистита, холестатический гепатит, повышение концентрации печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, ЛДГ), атония кишечника, лейкопения, гипофибриногенемия, панцитопения, тромбоцитопения, аллергические реакции.

Взаимодействие Циметидин, аллопуринол, циклоспорин А, макролидные антибиотики, оральные контрацептивы, противогриппозная сыворотка, диета с низким содержанием белков и высоким - углеводов - снижают клиренс и увеличивают риск развития побочных явлений. Фенобарбитал, фенитоин, ксантины, курение - ускоряют биотрансформацию (индуцируют микросомальные ферменты печени). Бета-адреноблокаторы уменьшают бронхолитическую активность. Адсорбенты, обволакивающие средства, антациды, окислители замедляют всасывание и редуцируют Стах, а ощелачивающие вещества - повышают. Усиливает эффекты диуретиков, снижает - НПВС (из группы производных пиразолона), бета-адреноблокаторов, пробенецида.

Передозировка Симптомы: агитация, спутанность сознания, судороги, тахикардия, аритмия, гипотония, тошнота, диарея, рвота с примесью крови, гипергликемия, гипокалиемия, метаболический ацидоз. Лечение: назначение активированного угля,

орошение кишечника комбинацией полиэт

Особые указания Лечение ретардными формами производится при периодическом контроле концентрации препарата в крови (не должна превышать 20 мкг/мл).

Литература Энциклопедия лекарств, 2003г