

Этоксисклерол

Страна-производитель Германия

Фарм-Группа Тромбообразующие средства

Производители Крейсслер Фарма(Германия)

Международное название Полидоканол

Лекарственные формы раствор для инъекций 0.5%, раствор для инъекций 1%, раствор для инъекций 2%, раствор для инъекций 3%

Состав Действующее вещество - Полидоканол.

Показания к применению Склерозирование варикозно расширенных вен, телеангиэктазий и геморроидальных узлов; облитерация или пристеночное склерозирование варикозного расширения вен пищевода и желудка при циррозе печени и непеченочных формах портальной гипертензии, инструментальный эндоскопический гемостаз при гастродуоденальных язвенных кровотечениях, кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.

Противопоказания Гиперчувствительность, шоковые состояния, атеросклеротическое поражение артерий конечности со стенозированием III-IV степени, хроническая артериальная недостаточность, острая форма тромбофлебита поверхностных вен, строгий постельный режим.

Побочное действие Аллергические реакции, локальный некроз кожи (d=2 мм) с образованием изъязвления (при внутридермальном введении в концентрации более 0,5 %), гиперпигментация участков кожи над склерозированными венами, тромбофлебит поверхностных и глубоких вен, узловой фиброз тканей в фрагментах склерозированных вен. При склерозировании геморраидальных узлов -боли в заднем проходе, в области предстательной железы, постинъекционные кровотечения из мест введения. При склерозировании варикозно расширенных вен пищевода и желудка - дисфагия, повышение температуры тела, головокружение, затруднение дыхания, дискомфорт в грудной клетке, тошнота, нарушения зрения, металлический привкус во рту, некрозы, изъязвления, кровотечения, перфорация, стенозы пищевода, плеврит, медиастенит.

Взаимодействие Усиливает аритмогенную активность наркотических средств.

Передозировка Симптомы: при паравазальных инъекциях - развитие некрозов. Лечение: введение 0,5-2 мл 1 % раствора новокаина или 5-20 мл изотонического раствора натрия хлорида в сочетании с гиалуронидазой.

Особые указания Перед началом лечения следует провести стандартное обследование (ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей, "маршевые пробы") и предупредить пациента о возможности развития гиперпигментации по ходу склерозированной вены конечностей (самостоятельно исчезает в течение 6-24 мес). С осторожностью применяют для склерозирования вен в области лодыжки и голеностопного сустава (рекомендуют небольшие дозы раствора минимальной концентрации). При геморрое одновременное введение возможно не более, чем в 2 геморраидальных узла (введение большего количества провоцирует выраженную боль, 1, 6, 37, 62); повторная процедура проводится не ранее, чем через 12-14 дней после стихания воспалительного процесса. В случае ошибочного в/а введения, грозящего развитием гангрены конечности, необходимо оставить иглу в артерии, ввести 5-10 мл 2 % раствора лидокаина или новокаина, гепарин в дозе 5000 ЕД, ишемизированную конечность обернуть ватой, обложить льдом, опустить вниз, наладить в/в инфузию

реополиглюкина с гепарином в дозе 400 ЕД на 1 кг массы тела.

Литература Энциклопедия лекарств 2003 г.Энциклопедия лекарств 2001 г.