

Эфедрина гидрохлорид

Страна-производитель Беларусь , Кноль АГ Германия , Московский эндокринный завод Россия , Тверская фармацевтическая фабрика Россия

Фарм-Группа Симпатомиметики (адреномиметики непрямого действия)

Производители Белмедпрепараты(Беларусь), Кноль АГ(Германия), Московский эндокринный завод(Россия), Тверская фармацевтическая фабрика(Россия)

Международное название Эфедрин

Лекарственные формы раствор для инъекций 5%, капли назальные 2%, капли назальные 3%, субстанция

Состав Действующее вещество - эфедрина гидрохлорид.

Показания к применению Бронхиальная астма, сенная лихорадка, крапивница, сывороточная болезнь и др. аллергические заболевания, риниты, гипотония (операции, спинномозговая анестезия, травмы, кровопотеря, инфекционные заболевания, гипотоническая болезнь и др.), нарколепсия, отравление снотворными и наркотическими средствами, энурез; местно - в качестве сосудосуживающего средства, для расширения зрачка (с диагностической целью).

Противопоказания Гиперчувствительность, бессонница, гипертензия, атеросклероз, органические заболевания сердца, гипертиреоз.

Побочное действие Легкая дрожь, сердцебиение (через 15-30 мин после приема внутрь, 1, 6, 37, 62); нарушение сна, повышение АД, нервное возбуждение, тремор, задержка мочи, потеря аппетита, рвота, усиленное потоотделение, бессонница, сыпь.

Взаимодействие Нет сведений.

Передозировка Симптомы: нервное возбуждение, бессонница, расстройства кровообращения, дрожание конечностей, задержка мочи, потеря аппетита, рвота, усиленное потоотделение, сыпь.

Особые указания Не следует назначать эфедрин и содержащие его препараты перед сном.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 год. Справочник "Лекарственные средства" М.Д. Машковский 2000 год.