

Юкалин

Страна-производитель Соединенные Штаты Америки

Фарм-Группа Адаптогенные средства

Производители Ай энд Си Фармасьютикал(Соединенные Штаты Америки)

Международное название Мелатонин

Синонимы Мелаксен, Мелатонин

Лекарственные формы таблетки 3мг

Состав Активное вещество - мелатонин.

Показания к применению Бессонница, утомляемость, депрессивный синдром, десинхроноз.

Противопоказания Повышенная чувствительность, хроническая почечная недостаточность, аллергические, аутоиммунные заболевания, лимфогранулематоз, лейкоз, лимфома, миелома, эпилепсия, сахарный диабет, беременность, лактация.

Побочное действие Головная боль, тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции.

Взаимодействие Усиливает эффект (взаимно) препаратов, угнетающих ЦНС и бета-адреноблокаторов. Несовместим с ингибиторами МАО, глюкокортикоидами, циклоспорином.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания Не рекомендуется одновременный прием с НПВС (ацетилсалициловой кислотой, ибупрофеном), со средствами, угнетающими ЦНС и бета-адреноблокаторами. Не следует применять во время работы водителям транспортных средств и людям, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Необходимо проинформировать женщин, желающих забеременеть, о наличии у препарата слабого контрацептивного действия.

Литература Энциклопедия лекарств 2006г.