

Юринекс

Страна-производитель Югославия

Фарм-Группа Петлевые диуретики

Производители Инекс Хемофарм(Югославия)

Международное название Буметанид

Синонимы Буринекс, Буфенокс

Лекарственные формы таблетки 1мг, раствор для инъекций 0.5мг

Состав Действующее вещество - Буметанид.

Показания к применению Отечный синдром: отек легких и мозга, застойная сердечная и печеночная недостаточность, цирроз печени, поздний токсикоз беременности.

Противопоказания Гиперчувствительность (в т.ч. к др. сульфонилам), острая почечная недостаточность, почечная кома, декомпенсированный сахарный диабет, подагра, острый гепатит, гипокалиемия, I триместр беременности.

Побочное действие Тошнота, боли в животе, сухость во рту, жажда, головокружение, мышечная слабость, нарушения слуха, тромбозы и эмболии, гипокалиемия, гипохлоремия, гипонатриемия, гиперурикемия, гипергликемия.

Взаимодействие Аминогликозиды и препараты лития повышают риск возникновения нефротоксических эффектов. Калийсберегающие диуретики повышают вероятность гипокалиемии. Пробенецид и индометацин уменьшают диуретические (салуретические) свойства.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Необходимо контролировать уровень электролитов, мочевой кислоты и глюкозы в крови.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.Энциклопедия лекарств 2002 г.