

## Ютаксан

Страна-производитель Норвегия , Никомед Фарма АС Индия  
Фарм-Группа Алкалоиды и другие цитостатические ср-ва растительного происхождения

Производители Никомед Фарма АС(Норвегия), Никомед Фарма АС(Индия)  
Международное название Паклитаксел  
Синонимы Абитаксел, Интаксел, Митотакс, Паклитакс, Паклитаксел-Лэнс, Паклитаксел-Эбеве, Паксен, Таксол  
Лекарственные формы концентрат для приготовления инфузионного раствора 6мг/мл

Состав Действующее вещество - паклитаксел.

Показания к применению Метастатический рак яичников: химиотерапия первой (в комбинации с препаратами платины) и второй линии, прогрессирование процесса, в т. ч. при резистентности к препаратам платины, метастатический рак молочной железы (в комбинации с антрациклинами или монотерапия при резистентности к ним), немелкоклеточный рак легкого, плоскоклеточный рак головы и шеи, переходноклеточный рак мочевого пузыря, рак пищевода, лейкомия, саркома Капоши у больных СПИДом.

Противопоказания Гиперчувствительность, выраженная нейтропения и тромбоцитопения, нарушение функции печени, вирусные инфекции, угнетение костномозгового кроветворения после предшествующей химио- или лучевой терапии, заболевания сердечно-сосудистой системы, беременность, кормление грудью.

Побочное действие Угнетение костномозгового кроветворения, алопеция, тошнота, рвота, анорексия, диарея, мукозит, обструкция и перфорация кишечника, тромбоз брыжеечных сосудов, ишемический колит, повышение уровня щелочной фосфатазы, билирубина и др. функциональных показателей печени, снижение толерантности к инфекциям, бради- и тахикардия, гипо- и гипертензия, нарушения AV проводимости, периферические нейропатии, атаксия, эпилептические припадки, энцефалопатии, изменение остроты зрения и др. неврологические расстройства, артралгия, миалгия, аллергические реакции , реакции в месте введения.

Взаимодействие Введение после цисплатина (при поочередной инфузии препаратов) усиливает угнетение костного мозга и приводит к снижению CI (на 20%). Кетоконазол снижает биотрансформацию.

Передозировка Симптомы: миелосупрессия, периферическая нейротоксичность, мукозиты. Лечение: симптоматическое.

Особые указания Лечение должно проводиться врачом. Обязателен постоянный контроль периферической крови, АД, ЧСС, и др. параметров жизненно важных функций. Во избежание развития тяжелых реакций гиперчувствительности перед инфузией всем пациентам следует проводить премедикацию глюкокортикоидами, антигистаминными препаратами и блокаторами гистаминовых H<sub>2</sub>-рецепторов. При возникновении тяжелых аллергических реакций во время инфузии введение немедленно прекращают и проводят симптоматическую терапию. С осторожностью применяют при работе с механизмами и машинами и др. видами деятельности, требующих точности действий (содержит этанол). Во время лечения рекомендуется использовать адекватные методы предупреждения беременности. Более подробную

информацию см. инструкцию по применению.  
Литература Энциклопедия лекарств 2004 год.