

Адиуретин

Страна-производитель Чехия

Фарм-Группа Средства на основе гормонов задней доли гипофиза

Производители Ферринг-Лечива(Чехия)

Международное название Десмопрессин

Синонимы Адиуретин СД, Адиуретин-СД, Минирин, Эмосинт

Лекарственные формы капли в нос 0.1мг/мл

Состав Активное вещество - десмопрессин.

Показания к применению Несахарный диабет, острая полиурия, полидипсия после операции в области гипофиза, первичное ночное недержание мочи (только для интраназального применения, 1, 6, 37, 62); для внутривенного введения - гемофилия А, болезнь Виллебранда (кроме типа IIb, 1, 6, 37, 62); никтурия.

Противопоказания Повышенная чувствительность, анурия, задержка жидкости различной этиологии, врожденная или психогенная полидипсия, гипоосмолярность плазмы, недостаточность кровообращения, необходимость терапии диуретиками. Для внутривенного введения - нестабильная стенокардия, болезнь Виллебранда типа IIb, беременность.

Побочное действие Транзиторная головная боль, тошнота, спастическая боль в животе, дисальгоменорея, умеренная артериальная гипертензия, приливы, умеренное понижение артериального давления, компенсаторная тахикардия (при внутривенном введении), аллергические реакции; отечность, локальная гиперемия, боль в месте инъекции.

Взаимодействие Усиливает эффект вазопрессорных препаратов.

Передозировка Нет данных.

Особые указания Для снижения опасности водной интоксикации и гипонатриемии следует ограничить употребление жидкости (особенно детям, подросткам, людям пожилого возраста) употребление жидкости.

Литература 1. Реестр Лекарственных средств 2004 года.