

Азона

Страна-производитель Финляндия

Фарм-Группа Антидепрессанты - избирательные ингибиторы нейронального захвата

Производители Орион Корпорейшн(Финляндия)

Международное название Тразодон

Синонимы Триттико

Лекарственные формы капсулы 25мг, капсулы 50мг, капсулы 100мг

Состав Действующее вещество - тразодон.

Показания к применению Депрессивные состояния органического и психогенного происхождения в т.ч. с выраженной тревожностью, при наличии как минимум четырех из перечисленных признаков депрессии: изменение аппетита, сна, психомоторная ажитация или заторможенность, снижение интереса к обычным делам, понижение сексуальной инициативы, утомляемость, чувство вины, замедление мышления, ухудшение концентрации внимания, суицидальные мысли; булимия, клептомания, профилактика мигрени, тревожность, фобии (в т.ч. агорафобии), острый алкогольный абстинентный синдром, бензодиазепиновая зависимость, для премедикации.

Противопоказания Гиперчувствительность, начальный период после инфаркта миокарда, нарушения ритма сердца, выраженные расстройства функции печени и почек, беременность, кормление грудью (на время лечения исключено).

Побочное действие Изменение зрения, раздражение глаз, заложенность носа, запор, диарея, сухость и горечь во рту, тошнота, рвота, головокружение, сонливость, утомляемость, головная боль, миалгии, дискоординация, парестезии, дезориентация, затемнение сознания, тремор, нарушение ритма сердца и проводимости, брадикардия, фибрилляция предсердий, артериальная гипотензия с элементами ортостатической гипотензии и синкопальными состояниями, лейкопения, нейтропения (обычно незначительная), приапизм, аллергический отек, кожные аллергические реакции.

Взаимодействие Изменяет эффект варфарина (увеличивает или снижает), потенцирует эффект препаратов, угнетающих ЦНС, в т.ч. барбитуратов, алкоголя. Антигипертензивные средства повышают риск ортостатической гипотензии. Уменьшает гипотензию, вызываемую клонидином. Увеличивает плазменную концентрацию дигоксина и фенитоина.

Передозировка Симптомы: тошнота, сонливость, приапизм, остановка дыхания, эпилептиформные припадки, изменения на ЭКГ, учащение и утяжеление побочных реакций. Лечение: промывание желудка и форсированный диурез для ускорения элиминации, поддержание жизненно важных функций

Особые указания При назначении сразу после отмены ингибиторов МАО или вместе с ними, терапию проводят крайне осторожно. Не рекомендуется сочетать с электрошоками. Пациентов мужского пола следует предупредить о необходимости немедленного обращения к врачу (прекратив прием тразодона), если появляются продолжительные и неадекватные эрекции. Поскольку до достижения ремиссии могут сохраняться суицидальные тенденции, пациенту следует выписывать препарат в минимальном необходимом количестве. С осторожностью (при постоянном мониторинге сердечного ритма) назначают при заболеваниях сердца, гипертензии (из-за повышенного риска гипотензивных реакций может потребоваться редукция доз антигипертензивных препаратов). Перед операцией под общим наркозом обязательна

заблаговременная отмена тразодона. В период лечения не рекомендуется прием алкогольных напитков. С осторожностью применять во время работы водителям транспортных средств и людям, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания.

Литература Энциклопедия лекарств 2003 год.