

Азопт

Страна-производитель Соединенные Штаты Америки
Фарм-Группа Противоглаукомные средства

Производители Алкон-Лабораторис(Соединенные Штаты Америки)

Международное название Бринзоламид

Лекарственные формы суспензия глазная 1%

Состав Активное вещество - бринзоламид.

Показания к применению Повышенное внутриглазное давление у больных с глазной гипертонией или открытоугольной глаукомой.

Противопоказания Гиперчувствительность. Ограничения к применению.

Беременность, кормление грудью, детский возраст.

Побочное действие Затуманивание зрения, блефарит, дерматит, сухость глаз, ощущение инородного тела в глазу, головная боль, гиперемия, выделения из глаз, дискомфорт в глазах, кератит, боль и зуд в глазах, конъюнктивит, диплопия, головокружение, астенопия, кератоконъюнктивит, кератопатия, первые признаки блефарита (ощущение слипания век или корочки на краях век), слезотечение; ринит, одышка, фарингит; горький, кислый или необычный вкус во рту, диарея, сухость во рту, диспепсия, тошнота; аллергические реакции, крапивница, алопеция, боль в груди, гипертония, боль в почках.

Взаимодействие Вероятность усиления известных системных эффектов, связанных с ингибированием карбоангидразы, у пациентов получающих ингибиторы карбоангидразы внутрь и местно (не рекомендуется одновременно применять бринзоламид в виде инстилляционной формы и пероральные ингибиторы карбоангидразы).

Передозировка При приеме внутрь могут возникнуть следующие симптомы: нарушение электролитного баланса, ацидоз, нарушения со стороны нервной системы. Лечение: симптоматическое, необходим мониторинг уровня электролитов (особенно калия) в крови и контроль величины pH кров

Особые указания Бринзоламид является сульфаниламидом и хотя применяется местно, подвергается системной абсорбции. В связи с этим при применении бринзоламида в виде глазных капель могут возникнуть побочные реакции, характерные для сульфаниламидов. При появлении серьезных побочных реакций или при проявлении гиперчувствительности применение следует прекратить. В редких случаях при пероральном применении ингибиторов карбоангидразы с большими дозами салицилатов были зарегистрированы изменения кислотно-основного и электролитного баланса. Поэтому при терапии бринзоламидом следует учитывать возможность такого лекарственного взаимодействия у пациентов. У больных с острой закрытоугольной глаукомой помимо средств, применяющихся при офтальмогипертонии, необходимы дополнительные терапевтические меры. Поскольку бринзоламид (и его метаболит) выводится главным образом через почки, его не рекомендуют при данной патологии. У пациентов с нарушением функции печени бринзоламид следует использовать с осторожностью. Следует соблюдать осторожность при вождении транспортных средств и работе с техникой (в связи с возможностью временного затуманивания зрения после инстилляции). Перед применением препарата следует снимать контактные линзы и надевать их не ранее чем через 15 мин после закапывания.

Литература Энциклопедия лекарств 2005 г.

