

Аклотин

Страна-производитель Польша

Фарм-Группа Антиагреганты

Производители АЙ СИ ЭН Польша Жешув(Польша)

Международное название Тиклопидин

Синонимы Тагрел, Тиклид, Тикло

Лекарственные формы таблетки покрытые оболочкой 250мг

Состав Активное вещество-Тиклопидин

Показания к применению Острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, преходящие нарушения мозгового кровообращения, состояния после протезирования клапанов сердца, аортокоронарного шунтирования и ангиопластики, тяжелый атеросклероз периферических артерий, перемежающаяся хромота, хронический гломерулонефрит, серповидно-клеточная анемия, микроангиопатия при сахарном диабете.

Противопоказания Гиперчувствительность, острые пептические язвы желудка, опасность кровотечения при обострении язвенной болезни желудка и двенадцати-перстной кишки, внутричерепное кровоизлияние, геморрагический диатез, нейтропения, тромбоцитопения, тяжелые нарушения функции печени, острый инсульт, беременность, лактация.

Побочное действие Желудочно-кишечные расстройства, реже-кровотечения, геморрагические высыпания, гематурия, тромбоцитопения, нейтропения, тяжелый агранулоцитоз, панцитопения, головокружение, головная боль, шум в ушах, астения, увеличение содержания холестерина и триглицеридов в сыворотке крови, повышение активности трансаминаз и щелочной фосфатазы, холестатическая желтуха, сыпь, зуд.

Взаимодействие Повышает ингибирующее влияние аспирина и др. НПВС на агрегацию тромбоцитов и увеличивает риск кровотечений. Антациды, уменьшая всасывание, снижают концентрацию в плазме на 18%. Циметидин, блокируя микросомальное окисление, снижает клиренс на 50%, на 15% уменьшает уровень дигоксина в крови, клиренс теофиллина. Увеличивает концентрацию фенитоина в плазме.

Передозировка Геморрагический синдром, судороги, гипотермия, одышка, вестибулярные нарушения. **Лечение:** Немедленно вызывать "Скорую помощь"

Особые указания Ограниченно применять при травмах, планируемых хирургических операциях, детском возрасте. В процессе лечения желателен контроль клеточного состава периферической крови и состояния свертывающей системы.

Литература Регистр лекарственных средств России 2002г, Гриффит "Новейшие лекарственные средства" т.2 стр. 386