

АКТ

Страна-производитель Соединенные Штаты Америки
Фарм-Группа Средства, содержащие фтор

Производители Джонсон и Джонсон(Соединенные Штаты Америки)

Международное название Натрия фторид

Синонимы Кореберон, Натриум флуоратум, Натрия фторид, Оссин

Лекарственные формы раствор для полоскания рта

Состав Активное вещество: Натрия фторид.

Показания к применению Остеопороз: первичный (постменопаузальный, пресенильный, сенильный, идиопатический), стероидный (профилактика и лечение, 1, 6, 37, 62); локальные остеопатии, профилактика кариеса у детей и взрослых.

Противопоказания Для системного применения: выраженные нарушения функции почек или печени, обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, беременность, кормление грудью, детский возраст до 6 месяцев, 3 лет, 6 или 14 лет (в зависимости от лекарственной формы и дозы).

Побочное действие При системном применении: диспептические явления, боли в нижних конечностях и суставах, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, остеосклероз, эктопическая кальцификация (особенно при сочетании с витамином D или A), гипотиреоз, идиосинкразия, аллергические реакции (кожная сыпь и др.).

Взаимодействие Ионы кальция, магния и алюминия замедляют всасывание (образуя плохо растворимые соединения). Антациды снижают эффективность (рекомендуется применять их за 2 ч до приема натрия фторида). Витамины A и D способствуют эктопической кальцификации.

Передозировка Симптомы: слезотечение, гиперсаливация, тошнота, анорексия, кровавистая диарея и рвота, боли в животе, нижних конечностях и суставах, сужение зрачков, нарушение зрения, слабость, миастения, тремор, судороги, гипертермия, учащение пульса, гипотензия; возмо

Особые указания Прерывистый курс лечения рекомендуется при появлении артралгий на фоне постоянной терапии препаратом. Применение у детей до 6 лет требует специального контроля. У пациентов с заболеваниями крови в период терапии рекомендуется регулярное проведение анализов крови. Во время системного применения необходимо ежегодно проводить рентгеновское обследование для оценки эффективности терапии и решения вопроса о продолжении лечения, а также для раннего выявления флюороза. При выборе дозы препарата следует учитывать содержание фторидов в питьевой воде. Для достижения адекватной минерализации костной ткани следует дополнительно обеспечить поступление в организм кальция и магния.Повышение уровня щелочной фосфатазы свидетельствует о развитии эффекта.

Литература Энциклопедия лекарств, 2004г.