

Активированный уголь

Страна-производитель Соединенные Штаты Америки

Фарм-Группа Сорбенты

Производители Нэйчерс Вэй Продактс Инк(Соединенные Штаты Америки)

Международное название Активированный уголь

Синонимы Активированный уголь "Мекс", Активированный уголь СКН, Карбактин, Карбо медициналис, Карболонг, Карбомикс, Микросорб П, Уголь активированный, Уголь активированный "КМ", Уголь активированный МС, Уголь активированный ФАС-Э, Уголь активированный-УБФ, Ультра-

Лекарственные формы капсулы 280мг

Состав Активное вещество - активированный уголь.

Показания к применению Диспепсия, заболевания, сопровождающиеся процессами гниения и брожения в кишечнике, повышенная кислотность и гиперсекреция желудочного сока, диарея, острые отравления, заболевания с токсическим синдромом - пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия, ожоговая болезнь в стадии токсемии и септикотоксемии, хронический и вирусный гепатиты, цирроз печени, хроническая почечная недостаточность; бронхиальная астма; атопический дерматит, подготовка к рентгенологическим исследованиям.

Противопоказания Повышенная чувствительность, язвенные поражения ЖКТ, желудочные кровотечения, одновременное назначение антитоксических веществ, эффект которых развивается после всасывания.

Побочное действие Диспепсия, снижение всасывания из ЖКТ жиров, белков, витаминов, гормонов, питательных веществ и др.; запор или понос, окрашивание стула в черный цвет; при гемоперфузии через активированный уголь возможно развитие эмболии, геморрагии, гипокальциемии, гипогликемии, гипотермии, гипотензии.

Взаимодействие Снижает всасывание и эффективность лекарственных препаратов, уменьшает активность внутрижелудочно действующих веществ.

Передозировка Нет данных.

Особые указания Хранение на воздухе (особенно во влажной среде) снижает сорбционную способность.

Литература 1. Реестр Лекарственных средств 2003 года.