

Актипол

Страна-производитель Россия , Предприятие по пр-ву бактериальных и вирусных препаратов им.Чумакова Россия

Фарм-Группа Противовирусные средства разных групп

Производители Диафарм институт молекулярной диагностики(Россия), Предприятие по пр-ву бактериальных и вирусных препаратов им.Чумакова(Россия)

Международное название Аминобензойная кислота

Лекарственные формы капли глазные 0.007%, раствор для инъекций и закапывания в глаз 70мкг/мл

Состав Действующее вещество - Аминобензойная кислота.

Показания к применению · вирусные заболевания глаз (в т.ч. конъюнктивиты и кератоконъюнктивиты, вызванные вирусами Herpes simplex, Varicella zoster и аденовирусами, 1, 6, 37, 62);· кератопатии инфекционного, посттравматического и постоперационного генеза.

Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочное действие Местные реакции: редко - аллергические реакции, гиперемия конъюнктивы.Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Актипол при беременности и в период лактации не проводилось.

Взаимодействие При одновременном применении с нуклеозидами-ингибиторами обратной транскриптазы (ацикловир, ганцикловир, АРА-А, ТФТ) и антибиотиками отмечается усиление терапевтического действия Актипола.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Не следует назначать Актипол одновременно с сульфаниламидными препаратами для местного применения. При случайном приеме внутрь препарата Актипол риск развития нежелательных побочных эффектов отсутствует. После вскрытия стеклянного флакона препарат можно использовать в течение 7 дней, после вскрытия флакона-капельницы из полимерного материала - 14 дней.

Литература Справочник Видаль 2004 г.