

Алгомин

Страна-производитель Соединенные Штаты Америки
Фарм-Группа Комбинированные анальгетики-антипиретики

Производители Пеннех Лабс(Соединенные Штаты Америки)

Международное название Ацетилсалициловая кислота+Парацетамол+Кофеин

Синонимы Аквацитрамон, Алгон, Аскофен плюс, Аскофен-АНВИ, Аскофен-П, Ацифеин, Иралгезик, Кофицил-Плюс, Неуранидал, Олдон, Томапирин, Цефекон П, Цитрамон МФФ, Цитрамон П, Цитрамон П-МИК, Цитрамон-боримед, Цитрапар

Лекарственные формы таблетки

Состав Ацетилсалициловая кислота, парацетамол, кофеин.

Показания к применению Болевой синдром слабой и умеренной выраженности: головная боль и зубная, невралгия, артралгия, миалгия, дисменорея и др.; лихорадка при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Противопоказания Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, выраженные нарушения функции печени и почек, гипокоагуляция, генетически обусловленный дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, глаукома, бронхиальная астма, первый триместр беременности, кормление грудью.

Побочное действие Со стороны органов ЖКТ: боль в области желудка, тошнота; нарушение функции печени, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (при длительном приеме высоких доз).Прочие: сердцебиение, бронхоспазм, нарушение функции почек.

Взаимодействие Усиливает действие антикоагулянтов и антиагрегантов, побочные эффекты и др. НПВС и ненаркотических анальгетиков, глюкокортикоидов, сульфаниламидов, метотрексата.Не следует сочетать с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином, алкоголем.

Передозировка Симптомы: боль в желудке, тошнота, рвота, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия.Лечение: промывание желудка с использованием активированного угля, симптоматическая терапия.

Особые указания Не назначают детям до 15 лет на фоне ОРВИ или гриппа (возможно развитие синдрома Рейе).С осторожностью назначают в пожилом возрасте, при нарушении функции печени или почек.Не следует принимать более 5 дней в качестве болеутоляющего и 3 дней в качестве жаропонижающего средства без консультации и наблюдения врача.

Литература Регистр Лекарственных средств 2003 года.