

Алексан

Страна-производитель Германия , Эбеве Фарма ГмбХ Австрия
Фарм-Группа Антиметаболиты - аналоги пиримидина

Производители Генрих Мак Наследник(Германия), Эбеве Фарма ГмбХ(Австрия)

Международное название Цитарабин

Синонимы Цитарабин, Цитарабин-ЛЭНС, Цитозар, Цитонал

Лекарственные формы раствор для инъекций 40мг/2мл, раствор для инъекций 100мг/5мл, раствор для инъекций, раствор для инъекций 500мг/10мл, раствор для инъекций 1000мг/20мл

Состав Активное вещество - цитарабин.

Показания к применению Лимфобластный и миелобластный лейкоз, хронический миелолейкоз, эритролейкоз, лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы, синдром дисплазии костного мозга.

Противопоказания Гиперчувствительность, острые инфекционные заболевания, лучевая и химиотерапия, аплазия костного мозга, недостаточность функции печени и почек, беременность и лактация.

Побочное действие Угнетение костного мозга, стоматит, миалгия, костная и загрудинная боли, головная боль, кровотечения в ЖКТ, эзофагит, тошнота, рвота, диарея, лейкопения, тромбоцитопения, мегалобластная анемия, тромбофлебит, нарушения деятельности ЦНС, печени, гиперурикемия, нефропатия, панникулит, отек легких, диффузный интерстициальный пневмонит, зуд, выпадение волос, лихорадка, папулезная сыпь, конъюнктивиты, тревога.

Взаимодействие Возможен суммационный эффект с метотрексатом. Тормозит всасывание дигоксина в ЖКТ.

Передозировка 12-кратная внутривенная инфузия цитарабина в дозе 4,5г/кв.м каждые 12 часов вызывает необратимые изменения ЦНС и летальный исход.

Особые указания Нет.

Литература Энциклопедия лекарств, 2003г.