А.Т.10

Страна-производитель Германия

Фарм-Группа Средства на основе гормонов околощитовидных желез

Производители Мерк КГаА(Германия)

Международное название Дигидротахистерол

Синонимы Дигидротахистерол, Тахистин

Лекарственные формы раствор 1мг/мл

Состав Активное вещество-Дигидротахистерол.

Показания к применению Недостаточность секреции паратгормона: гипопаратиреоз (аутоиммунный, послеоперационный, после лечения радиоактивным йодом, травматический, при саркоидозе или туберкулезе, опухолевый, 1, 6, 37, 62); функциональный гипопаратиреоз (недостаточная секреция паратгормона в ответ на гипокальциемию): у новорожденных, родившихся от матерей, страдающих гипопаратиреозом; идиопатическая неонатальная гипокальциемия; гипомагниемия (мальабсорбция, рвота и диарея, стеаторея, сахарный диабет, острый панкреатит, алкоголизм, 1, 6, 37, 62); недостаток витамина D (алиментарный дефицит, недостаток УФ лучей, мальабсорбция, стеаторея, синдром короткого кишечника, хронический панкреатит, спру, 1, 6, 37, 62); периферическая резистентность к паратгормону: псевдогипопаратиреоз (синдром Олбрайта, 1, 6, 37, 62); хроническая почечная недостаточность (почечная остеодистрофия, 1, 6, 37, 62); гипокальциемия ятрогенной природы: гиперфосфатемия (в т.ч. пищевого генеза, 1, 6, 37, 62); назначение больших доз ЭДТА, митрамицина, актиномицина, неомицина, бифосфонатов, тиазидных диуретиков, длительное применение слабительных, фенобарбитала и др. противосудорожных средств, передозировка кальцитонина; массивная трансфузия цитратной крови, операция в условиях экстракорпорального кровообращения.

Противопоказания Гиперкальциемия, беременность.

Побочное действие Бледность, головные боли, головокружение, слабость, сердцебиение, жажда, диспептические расстройства (отсутствие аппетита, тошнота, рвота, понос), боли в правом подреберье, обусловленные сокращениями желчного пузыря, нарушение функции почек, кардиосклероз, пневмосклероз, нефросклероз (при длительном применении).

Взаимодействие Рациональным является сочетание с препаратами кальция. Несовместим с др. препаратами витамина D. Тиазидные диуретики способствуют развитию гиперкальциемии. Не рекомендуется комбинация с фенотеролом.

Передозировка Симптомы: усиление побочных эффектов, связанных с гиперкальциемией. Возможно появление атаксии, амнезии, дезориентации, галлюцинаций, синкопальных состояний, гипотонии, гиперкальциемической комы. Лечение: немедленная отмена препарата, постельный режим, оби

Особые указания Для профилактики гиперкальциемии необходим регулярный контроль содержания кальция и фосфора в крови и моче. Рекомендуется придерживаться диеты с высоким содержанием в пище кальция и малым - фосфора. У пациентов с гипотиреозом, находящихся на лечении тиреоидными гормонами и получающих дигидротахистерол, отмена последнего должна проводиться с осторожностью из-за опасности гиперкальциемии.

Литература 1. Энциклопедия лекарств 2002г.2. Лекарственные средства, Машковский

М.Д. изд. №14, 2000г.