

Язва Пептическая (Peptic Ulcer) - повреждение слизистой оболочки пищеварительного тракта, возникающее в результате разрушающего воздействия на нее пепсина и соляной кислоты. Пептическая язва может развиваться, если пепсин и кислота присутствуют в организме больного в аномально высокой концентрации или когда в силу каких-либо причин снижаются нормальные защитные механизмы, предохраняющие слизистую оболочку пищеварительного тракта от повреждения; желчные соли также могут принимать участие в образовании таких язв (особенно язвы желудка). Пептическая язва может развиваться в пищеводе (пептическая язва пищевода (oesophageal ulcer), в этом случае она обычно сопровождается возникновением рефлюкс-эзофагита, 1, 6, 38, 62); в желудке (см. Язва желудка), двенадцатиперстной кишке (см. Язва двенадцатиперстной кишки, 1, 6, 38, 62); тощей кишке (язва тощей кишки (jejunal ulcer), обычно как одно из проявлений синдрома Золлингера-Эллисона, 1, 6, 38, 62); при наличии у человека меккелевого дивертикула или поблизости от места проведения гастроэнтеростомии (пептическая язва анастомоза (stomal ulcer), язва анастомоза (anastomatic ulcer), краевая язва (marginal ulcer)).